

268

**ALBATROS REAL (*Diomedea epomophora*) NO SUL DO BRASIL.** Vanda S. Fonseca, Maria V. Petry (Centro de Ciências da Saúde - UNISINOS)

O Albatroz real (*D. epomophora*) é uma ave pelágica da família Diomedidae. Apresenta distinção quanto ao padrão de coloração entre jovens e adultos, assim como dimorfismo sexual, em geral, os machos são maiores com predominância da plumagem branca, na fase adulta. Nidifica na região da Nova Zelândia e em ilhas subantárticas. Sua distribuição é circumpolar pelos oceanos do sul. É um albatroz raro na costa brasileira, havendo apenas três registros para o Rio Grande do Sul. Foram realizados durante 1997 e 1998 onze monitoramentos na faixa litorânea entre Pinhal (30°15'S; 50°15'W) e a Lagoa do Peixe (31°20'S; 51°05'W), sendo que dois destes tiveram abrangência de Torres (29°20'S 49°44'W) ao Chuí (33°45'S; 53°22'W). O trajeto foi percorrido de carro, a uma velocidade média de 30 km/h, propiciando a censagem e/ou coleta das aves mortas. A quilometragem total percorrida ao longo da costa do Rio Grande do Sul é de 2595 Km, onde foram registrados apenas dois espécimes de *D. epomophora*, nas latitudes 31°13'S; 50°52'W e 30° 23'S; 50° 17'W, respectivamente nos meses de outubro de 1997 e junho de 1998. Dos dois exemplares foram tomados os dados biométricos e tiveram seus estômagos retirados e conservados em álcool 70%. Na análise dos conteúdo estomacal foi registrada a presença de: ossos e otólito, bicos de cefalópode, das famílias Lycoteuthidae e Ommastrephidae. Constatou-se, também, a ocorrência de plástico e nematódios. (UNISINOS/UNESCO)