

Nursing Interventions Classification (NIC)



Sixth Edition

Gloria M. Bulechek
Howard K. Butcher
Joanne M. Dochterman
Cheryl Wagner

ELSEVIER

CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS CUIDADOS PRESCRITOS PARA PACIENTES SUBMETIDOS À ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL E A CLASSIFICAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM DA NIC

maripalma88@gmail.com

Mariana Palma da Silva

Orientadora: Miriam de Abreu Almeida



INTRODUÇÃO

A Artroplastia Total de Quadril (ATQ) é uma cirurgia recomendada para pacientes com afecções da articulação coxofemoral, sejam elas degenerativas, inflamatórias ou traumáticas. No período pós-operatório, a maioria dos pacientes recebe o diagnóstico de enfermagem (DE) Mobilidade Física Prejudicada, devido às limitações para mobilizar-se. Os enfermeiros realizam diferentes cuidados de enfermagem para solucionar ou minimizar este DE. Pode-se utilizar uma linguagem padronizada como a Nursing Interventions Classification (NIC) para denominar o tratamento de enfermagem.

OBJETIVO

Comparar os cuidados de enfermagem prescritos para pacientes com diagnóstico de enfermagem Mobilidade Física Prejudicada submetidos à Artroplastia Total de Quadril com as intervenções sugeridas pela Nursing Interventions Classification (NIC).

METODOLOGIA

Estudo descritivo, transversal, desenvolvido em unidades de internação cirúrgica de um hospital universitário, de agosto a dezembro de 2012. Os dados foram coletados em sistema informatizado e analisados utilizando-se estatística descritiva e mapeamento cruzado. Projeto aprovado em Comitê de Ética em Pesquisa da instituição.

RESULTADOS

Foram avaliados 21 indivíduos, predominantemente do sexo feminino $n=13(61,9\%)$, com idade média de $58,8(\pm 16,7)$ e $15(71,4\%)$ foram submetidos à ATQ primária. Estes pacientes tiveram $37(47,36\%)$ cuidados de enfermagem prescritos, mapeados em 17 diferentes intervenções da NIC, com similaridade em 100% dos casos, sendo a maioria no domínio Fisiológico Básico (88%), nas classes Controle da Imobilidade (30%) e Controle do Risco (26%). As intervenções de maior frequência foram Controle da DOR $6(16,2\%)$, Cuidados com o REPOUSO no leito $5(13,5\%)$, Assistência no AUTOCUIDADO: Banho/Higiene $4(10,8\%)$, Controle do AMBIENTE $4(10,8\%)$, POSICIONAMENTO $3(8,1)$, Prevenção contra QUEDAS $3(8,1)$ e Terapia com EXERCÍCIO: deambulação $3(8,1)$.

CONCLUSÃO

Concluiu-se que existe correspondência entre os cuidados prescritos e as intervenções da NIC para o diagnóstico em estudo, que corrobora a aplicabilidade desta classificação na prática clínica.



Mariana Palma da Silva; Acadêmica do Curso de Graduação em Enfermagem/UFRGS, Bolsista de Iniciação Científica PROBIC FAPERGS-UFRGS.

Miriam de Abreu Almeida; Enfermeira, Doutora em Educação, Professora Associada da EENF/UFRGS.

REFERÊNCIAS

1 Bulechek GM, Dochterman J, Butcher H. Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC). 5ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2010.

2 Almeida MA, Pergher AK, Canto DF. Validação do mapeamento de cuidados prescritos para pacientes ortopédicos à classificação das intervenções de enfermagem. Rev. Latino-Am. Enfermagem.2010;18(1):[08 telas].