

Faculdade de Odontologia, UFRGS)

O Cisto Dentífero (CD) envolve a coroa de um dente retido e está preso em seu colo. Comum na prática Odontológica (1, 44%) dos dentes retidos. Nossos objetivos são: determinar a prevalência de Cistos Dentíferos originados em terceiros molares retidos; comparar a sensibilidade e especificidade dos achados clínicos trans-operatórios e dos achados radiográficos com o exame histopatológico. Nosso trabalho pretende estudar 158 peças operatórias operatórias de terceiros molares retidos de pacientes da F.O. UFRGS. Os dados apresentados são referentes a 100 peças operatórias estudadas até o momento. Realizamos medição da peça a partir de radiografias, biópsia por aspiração, observação da existência de cavitação e exame histopatológico. A presença de cavitação e conteúdo líquido foram considerados diagnósticos de C. D. Ao exame radiográfico, uma medida do espaço do folículo maior ou igual a 2, 5mm foi considerada compatível com CD. Obtivemos 7 casos de CD diagnosticados pelo Histopatológico (prevalência 7%), os achados clínicos tiveram sensibilidade de 100% e 95, 6% de especificidade. Os achados radiográficos tiveram 57, 1% de sensibilidade e 52, 6% de especificidade. (CNPq)