

188

TRANSTORNOS HIPERCINÉTICOS EM ESCOLARES DO SEGUNDO GRAU DA ESCOLA TÉCNICA DO VALE DO ITAJAÍ-FURB. *Josenei Braga dos Santos, Carlos Alberto Vargas Ávila* (Departamento de Educação Física e Desportos, FURB).

Sujeitos com tendências a hipercinesia apresentam problemas de adaptação social, dificuldades de aprendizagem, abuso de álcool e dependência de drogas. Os objetivos do estudo foram verificar os problemas de aprendizagem escolar, minimização dos transtornos hipercinéticos, esclarecimento do problema e orientação aos avaliados. Para avaliação dos alunos utilizou-se o questionário de Conners que constitui-se de duas versões: uma para pais e outra para professores tendo como amostra 94 alunos do 2º grau de ambos os sexos na faixa etária de 15 a 17 anos, onde obteve-se retorno de 60, 63% do total dos questionários, sendo 58, 51% válidos e 2, 12% nulo. Através da análise estatística, obteve-se dados parciais quanto a média e o desvio padrão por questão dos 47 questionários respondidos pelos professores e 55 questionários respondido pelos pais. O procedimento seguinte será análise global das questões por aluno, afim de identificar o índice de hipercinesia.