

PREVALÊNCIA DE HELICOBACTER PYLORI (HP) EM CRIANÇAS AVALIADAS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE (HCPA). *Letícia P. Luz, Patrícia P. Oliveira, Omar M. Bacha, Marcelo B. Sousa, Ciro P. Portinho, Marcos P. Moreira, Rogério M. Chultz (co-orient.), Vinícius D. Silva (co-orient.), Maria I. A. Edelweiss (orient.).* Serviço de Patologia - HCPA / Faculdade de Medicina - UFRGS.

O HP preenche cada um dos postulados de Koch como causa da gastrite crônica. A maior demonstração do papel da infecção pelo HP na patogênese da úlcera péptica (UP) reside no fato de que o tratamento com antimicrobianos causa remissão em 100% dos casos, com diminuição significativa da recorrência em 1 ano. Há discrepâncias nas prevalências de gastrite/UP gástrica e duodenite/UP duodenal associadas à HP entre crianças e adultos em estudos realizados na Inglaterra e nos EUA; em nosso meio, este dado é desconhecido. Em vista disso, delineou-se um estudo transversal para determinar a prevalência de HP em crianças entre 2 e 14 anos que realizaram endoscopia esofagogastroduodenal com biópsia no HCPA de 1990 a 1996, por apresentarem sinais e sintomas gastrointestinais indicativos para este procedimento. Todas as biópsias serão revistas por um único patologista, através de coloração por hematoxilina-eosina e Giemsa modificada, sendo preenchida, caso a caso, uma planilha de resultados, permitindo a obtenção de dados epidemiológicos sobre a abrangência deste fator etiológico nesta população.