

**945****A HISTÓRIA PSIQUIÁTRICA PREGRESSA PODE FORNECER PREDITORES DE REINTERNAÇÃO UM ANO APÓS A ALTA? ESTUDO LONGITUDINAL DE PACIENTES INTERNADOS EM LEITO PSIQUIÁTRICO EM HOSPITAL GERAL**

Paola Bell Felix de Oliveira, Gabriela de Carvalho, Caroline Dalla Nora, Eduardo Tarasconi Rushel, Fernanda Lucia Capitanio Baeza, Marcelo Pio de Almeida Fleck, Neusa Sica da Rocha. Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

Introdução: Após internações psiquiátricas, a reinternação é um desfecho frequente e relevante. Entretanto, os fatores relacionados a este desfecho permanecem, em grande parte, desconhecidos. Nossa hipótese é de que alguns elementos da história psiquiátrica pregressa podem estar relacionados a maior risco de reinternação futura. Objetivo: avaliar se a presença de internação psiquiátrica anterior, história de tentativas de suicídio prévias, maior tempo de doença e menor idade de início da doença estão associadas a maior risco de re-internação psiquiátrica um ano após a alta. Metodologia: Estudo longitudinal que avaliou pacientes que internaram em leito psiquiátrico no Hospital de Clínicas de Porto Alegre entre junho de 2011 e abril de 2013. Os fatores foram avaliados no momento da sua admissão e o desfecho, um ano após a alta, em entrevista por telefone. Foi utilizada regressão logística univariada para cada fator estudado. O fator foi considerado preditor quando  $p \leq 0,05$ . Os fatores considerados preditores na regressão univariada foram inseridos em modelo de regressão logística multivariada. Resultados: No período, 277 pacientes foram avaliados. Destes, 30% tiveram nova internação psiquiátrica um ano após a alta. Idade do primeiro diagnóstico (Exp(B) 1,01,  $p=0,13$ ) e tempo de doença (Exp(B) 0,98,  $p=0,127$ ), não foram previsores significativos. Hospitalização psiquiátrica anterior foi significativamente associada a reinternação ( $p < 0,001$ ), com Exp(B) 3,42 e  $R^2 = 0,055$  (Cox & Snell R Square), assim como história de tentativas de suicídio anteriores à internação (Exp(B) 1,7,  $p=0,049$ ,  $R^2 = 0,01$ ). Na regressão multivariada, os fatores de tentativa de suicídio e hospitalização psiquiátrica prévia tiveram  $R^2$  de 0,06. Entretanto, apenas hospitalização anterior manteve-se significativa (Exp(B) 3,19,  $p=0,001$ ). Discussão: entre os fatores avaliados, somente o histórico de internações anteriores foi preditor de nova internação em um ano. A presença de internação anterior aumentou em 3,42 vezes a chance de nova internação em um ano. Este fator, isoladamente, explicou 5,5% do desfecho. Faz-se necessário compreender de que modo as internações anteriores influenciam nas futuras, bem como buscar outros fatores que possivelmente estão relacionados com reinternação psiquiátrica. Palavra-chave: psiquiatria; reinternação; hospitalização. Projeto 10-265