

**VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO CAGE EM PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE.** L.H.B.Schönell, S.D.Stefani, S.C. Gonçalves, S.O.Martins, A.Hunsche, D.Rosa, R.Maynard, M.Rushel, P.Knapp, M.Pereira, S.G.Barros, A.A.Rosa (orientador). (Serviço de Medicina Interna, Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Curso de Pós-Graduação em Gastroenterologia FAMED UFRGS)

O questionário CAGE é largamente utilizado como instrumento para triagem de pacientes abusadores ou dependentes de álcool. Foi validado em hospital psiquiátrico, tanto em sua versão original como na versão em português. Com o objetivo de validar o CAGE para aplicação em pacientes internados no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), foram realizados dois estudos transversais idênticos, durante 1 dia de internação cada, incluindo todos os pacientes adultos e adolescentes elegíveis. Numa primeira etapa era aplicado nestes pacientes o questionário CAGE juntamente com outras 11 perguntas sobre hábitos gerais. A seguir, para o diagnóstico de alcoolismo foi utilizado o módulo de alcoolismo do *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders III-Revised* (DSM-III-R) em todos os 78 pacientes CAGE positivo e nos 83 pacientes CAGE negativo (controles) que foram sorteados e estratificados por área médica (clínica, cirúrgica, gineco-obstétrica e psiquiátrica). Dos 774 pacientes entrevistados, 390 (50%) eram do sexo feminino. A média de idade foi de 48,85 anos e 641 (83%) dos pacientes eram brancos. Houve predominância de homens (82%) entre os pacientes CAGE positivo ( $p < 0,001$ ). A sensibilidade encontrada para o questionário CAGE foi 85%, a especificidade 73%, o valor preditivo positivo 65,4% e o valor preditivo negativo 89%. O questionário CAGE mostrou-se um bom método para triagem de abusadores e dependentes de álcool no HCPA.