

ABORDANDO A QUALIDADE DOS MOMENTOS  
FINAIS DA VIDA DE PACIENTES COM AIDS  
P.B.V.SkolaudeD.B.SilvaM.Machado  
W.Schunemann V.Petrillo (UFRGS)

A ATITUDE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE FRENTE AO PACIENTE EM ESTÁGIO TERMINAL, ( AGONIZANTE MORRENDO ) DEMONSTRA MUITO DESPREPARO . TODA A MORTE É UM LONGO PROCESSO DE SOFRIMENTO QUE SE MANIFESTA EM MUITA DOR MEDO E ABANDONO..

IDENTIFICAMOS EM TODOS OS CASOS QUE, ALÉM DOS SINAIS CLÍNICOS, OS PACIENTES PASSAM A UTILIZAR O QUE CHAMARÍAMOS DE "LINGUAGEM SIMBÓLICA" APARENTEMENTE DISTÚRBIO DE COMPORTAMENTO. No ENTANTO, ABORDANDO ESTE TIPO DE SINTOMA ATRAVES DE UMA ÓTICA MENOS CLÍNICA, OBSERVAMOS QUE ALI ESTAVAM SERES HUMANOS BUSCANDO A LINGUAGEM IMAGINARIA PARA INFORMAR A APROXIMAÇÃO DA MORTE.(FIGURAS ARQUETÍPICAS ?)

OS PACIENTES ERAM VISITADOS DIARIAMENTE. RESOLVEMOS PROPORCIONAR AO PACIENTE UM AMBIENTE O MAIS TRANQUILO POSSÍVEL. IMEDIATAMENTE VERIFICAMOS QUE TODOS OS CASOS ASSIM ABORDADOS A NÍVEL COMPORTAMENTAAAL DIMINUÍRAM O GRAU DE ANGÚSTIA, ANSIEDADE E MEDO. E, SURPREENDEMENTE, A NÍVEL CLINICO TIVERAM SUA DOR REDUZIDA A NÍVEIS TÃO BAIXOS QUE PRESCINDIRAM DE SEDAÇÃO FORTE, QUE ATÉ ENTÃO, ERA O PROCEDIMENTO FREQUENTEMENTE ADOTADO PARA ENFRENTAR TAIS SINTOMAS.

Nos CASOS EM QUE EXPERIMENTAMOS A COMUNICAÇÃO NA LINGUAGEM SIMBÓLICA QUE OS PRÓPRIOS PACIENTE PARECIAM ESTAR PROPONDO, VERIFICAMOS MORTES SEM SOFRIMENTO EM PERÍODO DE TEMPO SIGINIFICATIVAMENTE MENOR EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE TEMPO OBSERVADO EM CASOS IDÊNTICOS ABORDADOS PELO PROCEDIMENTO padrão( $p < 0.005$ ). EM NENHUM DESTES CASOS FOI NECESSÁRIO PRESCREVER SEDAÇÃO FORTE - O QUE É COMUM EM CASOS DESTE TIPO.