

474 DESCRIÇÃO DO GIRINO DE PHYSALAEEMUS LISEI BRAUN & BRAUN, 1977
(ANURA, LEPTODACTYLIDAE). S.M.P.Gayer, S.A.S.Reis. (Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, UFRGS)

A coleta de um casl de *Physalaeemus lisei* eamplexo e sua reprQ
dução dentro do saco plastico utilizado para trans orte, nos proporei
onou o acompanhamento do desenvolvimento desta espécie. -

A descrição do girino, foi baseada em dois exemplares no estigio
36. Apresenta corpo ellptico, deprimido dorsoventralmente, ocupando
pouco mais que 1/3 do comprimento total. Disco oral de tamanho media
no, em posição ventral, marginado por papilas orais em fileiras du
plas, com claro rostral de tamanho mediano e sem claro mental. Uma pa
pila intramarginal em cada lado, nas regiões supra e infra-angular:-
Mandlbulas proporcionalmente pouco desenvolvidas, a superior curva e
a inferior formando um ângulo reto, marginadas por um bico córneo com
fino serrilhado. A fórmula das fileiras de dentes labiais é: 1, 1-1 /
1-1, 2; sem queratodontes adicionais. Olhos grandes, em posição dorso
lateral, distando das narinas cerca de 2/3 de seu próprio diâmetro. O
riflcios nasais arredondados, dorsais, com bordos salientes e ireci
nadoum pouco para frente. gistância internasal cerca de 3-4/5 da
distancia interocular. Espiraculo em posição ventrolateral esquerda,
iniciando na metade do corpo. Tubo cloacal no lado direito, uniforme
mente largo. Cauda de tamanho mediano, com altura máxima cerca de 3/4
da do corpo; é subp lela ao eixo axial, estreitando-se regularmente
em seu terço posterior. A nadadeira dorsal nasce na terça parte post
rior do cgrpo e a ventral na hase do tubo cloacal; mbas levemente
curVas. Musculos caudais visíveis. (PROPESP/UFRGS, CNPq)