

P 4402**Resultado de enfermagem cicatrização de feridas: primeira intenção para avaliar pacientes após colocação de prótese de quadril**

Mariana Palma da Silva, Bruna Engelman, Manoela Schmarczek Figueiredo, Thalita Santos, Vanessa Monteiro Mantovani, Alba Luz Rodríguez Acelas, Marcos Barragan, Luciana Menna Barreto, Amália de Fátima Lucena, Miriam de Abreu Almeida
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

INTRODUÇÃO: A Artroplastia Total de Quadril (ATQ) é uma cirurgia de substituição da articulação por prótese. No pós-operatório, os pacientes recebem o Diagnóstico de Enfermagem *Integridade Tissular Prejudicada* relacionada ao procedimento cirúrgico evidenciada pela presença de ferida operatória (FO). A evolução da FO pode ser acompanhada usando-se a Classificação de Resultados de Enfermagem (NOC), que é uma terminologia direcionada à avaliação da eficácia das intervenções de enfermagem. Cada Resultado de Enfermagem (RE) possui indicadores e escalas que permitem a mensuração em qualquer ponto de um continuum. **OBJETIVO:** Verificar a aplicabilidade clínica do RE *Cicatrização de Feridas: primeira intenção* na avaliação de pacientes submetidos à ATQ. **MÉTODOS:** Estudo longitudinal, realizado em 2015 em hospital universitário, com pacientes que realizaram ATQ, de ambos os sexos; idade ≥ 18 anos; internados por, no mínimo, três dias. O instrumento de coleta de dados continha o RE, seguido de sua definição e dos indicadores *Formação de cicatriz; Aproximação da Pele; Eritema, edema, temperatura aumentada e odor desagradável ao redor e na ferida; e Drenagem*. Cada indicador continha definição conceitual e operacional. Os pacientes foram avaliados de 3 a 4 dias, aplicando-se escala likert de 5 pontos que variava de *Nenhum* a *Extenso* para cada indicador. Os pacientes foram avaliados por duplas de coletadoras treinadas, havendo consenso entre as respostas. Utilizou-se a estatística descritiva para a análise dos dados. **RESULTADOS:** Foram incluídos 25 pacientes, predominantemente do sexo feminino (52%), brancos (88%), com idade média de 57,12 ($\pm 6,36$) anos. O RE *Cicatrização de Feridas: primeira intenção* foi encontrada diferença quando comparada as médias da primeira e última avaliação. As médias do indicador *Aproximação da Pele* variaram de 3,17 ($\pm 0,38$) a 4,10 ($\pm 0,77$), o indicador *Eritema, edema, temperatura aumentada e odor desagradável ao redor e na ferida* variou de 3,33 ($\pm 0,34$) a 4,14 ($\pm 0,96$) e o indicador *Drenagem* variou de 3,13 ($\pm 0,34$) a 4,19 ($\pm 0,68$). **CONCLUSÕES:** A melhora na cicatrização de feridas após ATQ foi evidenciada ao longo das avaliações realizadas, demonstrando a aplicabilidade da NOC. **Palavras-chaves:** Prótese de quadril, avaliação de resultados, cicatrização de feridas. Projeto 11-0601