



ASSOCIAÇÃO ENTRE ZUMBIDO E GRAU DE PERDA AUDITIVA EM PACIENTES PORTADORES DE OTITE MÉDIA CRÔNICA

Claudine Devicari Bueno

Orientadora: Profa. Dra. Adriane Ribeiro Teixeira

INTRODUÇÃO

O zumbido é um som percebido nos ouvidos ou na cabeça sem que haja uma fonte externa que gera esse som. Está associado a perdas condutivas, em especial em casos de otite, podendo provocar perda auditiva.

OBJETIVO

Verificar a associação entre o zumbido, a presença e o grau de perda auditiva em portadores de otite média crônica.

METODOLOGIA

Foram incluídos na amostra indivíduos que frequentavam ambulatório de otite média crônica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no período de 2002 a 2014.

- Todos avaliados pelo médico otorrinolaringologista
- Realizaram avaliação auditiva (anamnese e audiometria tonal liminar).
- Foi utilizado o teste Qui-quadrado de Pearson para análise estatística.

CONCLUSÃO

A análise dos dados permitiu concluir que, no grupo estudado, houve associação entre presença do zumbido com perda auditiva do grau leve e moderado somente na orelha direita.

RESULTADOS

1118 pacientes avaliados

565 (51,2%) sexo feminino

538(48,8%) sexo masculino

Média de idade de 28,9 anos

612 com zumbido

215(35,1%) na orelha direita

215(35,1%) na orelha esquerda

177(28,9%) ambas orelhas

- Verificou-se que na orelha direita a ausência de zumbido estava associada a limiares auditivos normais.
- A presença do zumbido ocorreu em associação a perda auditiva de grau leve e moderado.