

INTRODUÇÃO

A Artroplastia Total de Quadril (ATQ) é uma cirurgia de reconstituição da articulação pela substituição por prótese. Após a cirurgia, há melhora na qualidade de vida, na capacidade funcional e diminuição da dor nos pacientes. A partir de uma *query* realizada na instituição do estudo, observou-se que o Diagnóstico de Enfermagem (DE) da *NANDA Internacional* (NANDA-I) **Dor aguda** foi um dos três DE mais utilizados por enfermeiros de unidades de internação cirúrgica para estes pacientes. Tendo em vista a responsabilidade do enfermeiro na avaliação da dor dos pacientes, e entendendo este fenômeno como um experiência sensorial e emocional desagradável que surge da lesão tissular real ou potencial, podendo ter início súbito ou lento e de intensidade leve a intensa, decidiu-se elaborar um instrumento fundamentado na *Nursing Outcomes Classification* (NOC), que é uma classificação de resultados sensíveis às intervenções de enfermagem com possibilidade de ligações à NANDA-I.

OBJETIVO

Construir um instrumento para avaliação da dor em pacientes submetidos à ATQ.

METODOLOGIA

Para o DE Dor Aguda foi selecionado o Resultado de Enfermagem (RE) Nível de Dor com base no capítulo das ligações NANDA-I-NOC e em pesquisas de validação de conteúdo já realizadas. Este RE possui 14 indicadores, e nove deles foram selecionados pelos pesquisadores para comporem o instrumento, considerando-se sua experiência clínica com pacientes que realizam o procedimento cirúrgico investigado e a possibilidade de aplicação dos indicadores e para os cinco níveis da escala Likert, a partir da literatura, das classificações de enfermagem NANDA-I e NOC, e da experiência dos pesquisadores na prática

RESULTADOS

O instrumento elaborado contém nove indicadores: dor relatada, duração dos episódios de dor, expressões faciais de dor, encolhimento, agitação, irritabilidade, náusea, distúrbio do sono e diaforese. Construiu-se definições conceituais e operacionais para os indicadores, sendo estes avaliados por meio de duas escalas de medidas, que vão de Grave (1) a Nenhum (5) e de Desvio grave da variação normal (1) a Nenhum desvio da variação normal (5). O Quadro 1 apresenta parte do instrumento.

Nível da Dor (2102): Gravidade de dor observada ou relatada

INDICADORES	Definição operacional	Magnitude da definição operacional	DIA	Grave	Substan- cial	Modera- do	Leve	Nenhum	Observações
				1	2	3	4	5	
Dor relatada (210201) <i>Definição conceitual:</i> Caracteriza-se pelo autorrelato da experiência dolorosa. A resposta pode ser espontânea ou solicitada ¹ .	Aplicar a Escala numérica verbal (ENV), perguntando quanto ele classifica sua dor de 0 a 10.	1. Dez (10) = Dor de intensidade insuportável. 2. Sete a Nove (7 a 9) = Dor de forte intensidade. 3. Quatro a Seis (4 a 6) = Dor de intensidade moderada. 4. Um a Três (1 a 3) = Dor de fraca intensidade. 5. Zero (0) = Ausência de Dor.	1º						
			2º						
			3º						
			4º						
Duração dos episódios de dor (210204) <i>Definição conceitual:</i> Caracteriza-se pelo tempo de duração dos episódios de dor. <i>Definição conceitual:</i> Caracteriza-se pelo tempo de duração dos episódios de dor ² .	Perguntar ao paciente o tempo de duração dos episódios de dor, considerando período de 24 horas.	1. Os episódios de dor duram o tempo todo. 2. Os episódios de dor duram maior parte do tempo. 3. Os episódios de dor duram por mais de 1 hora. 4. Os episódios de dor duram até 1 hora. 5. Sem episódios de dor	1º						
			2º						
			3º						
			4º						

Quadro 1 – Visão parcial do Instrumento construído para avaliação da Dor Aguda de pacientes submetidos à ATQ

CONCLUSÃO

O instrumento construído para avaliação de pacientes submetidos a ATQ com DE Dor aguda ficou composto pelo resultado NOC Nível de Dor, nove indicadores. Elaborou-se definições conceituais e operacionais e duas escalas distintas para mensuração. Ele deverá ser testado e validado para futura implementação no Processo de Enfermagem informatizado do hospital.