



Evento	Salão UFRGS 2015: SIC - XXVII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2015
Local	Porto Alegre - RS
Título	ANÁLISE PROSPECTIVA DOS RESULTADOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DAS URETROPLASTIAS REALIZADAS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE.
Autor	FABIANO SERENA DE MORAIS
Orientador	BRASIL SILVA NETO

ANÁLISE PROSPECTIVA DOS RESULTADOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DAS URETROPLASTIAS REALIZADAS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE.

FABIANO SERENA DE MORAIS

BRASIL SILVA NETO.

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE.

Objetivo: Avaliar a satisfação e qualidade de vida dos pacientes submetidos a uretroplastia utilizando dois questionários de sintomas e compará-los com dados objetivos.

Materiais e Métodos: Incluímos prospectivamente 35 pacientes consecutivos submetidos a uretroplastia entre janeiro de 2012 e setembro de 2013. Dados demográficos, escore internacional de sintomas prostáticos (IPSS), escore de qualidade de vida, questionário de resultados relatados pelo paciente (PROM) com estenose de uretra, fluxo urinário máximo (Q_{max}) e resíduo pós-miccional foram coletados antes, dois e oito meses após a cirurgia. Falha foi considerada quando ocorreu qualquer instrumentação pós-operatória. GEE foi utilizada para comparar os resultados e regressão linear para correlacionar ambos os questionários com os dados objetivos.

Resultados: Idade média foi de 61 anos. A maioria das estenoses localizava-se na uretra bulbar (43,7%), com dezenove pacientes submetidos a algum procedimento prévio (59,3%). A técnica cirúrgica foi igualmente dividida entre termino-terminal e enxerto de mucosa oral. Sucesso cirúrgico foi de 87,5%. O IPSS melhorou significativamente de 18,71 para 5,32 aos 8 meses de seguimento ($p < 0,001$). O PROM diminuiu em média de 13,21 para 3,36 após a cirurgia ($p < 0,001$), e 84,3% dos pacientes estavam satisfeitos ou muito satisfeitos com a cirurgia. O Q_{max} aumentou de 4,64 ml/s para 11 ml/s ($p < 0,001$). Significativa correlação linear negativa entre Q_{max} e PROM ($r = -0,531$, $p < 0,001$) e Q_{max} e IPSS ($r = -0,512$, $p < 0,001$) foi observada.

Conclusão: a avaliação subjetiva de sintomas, através de questionários específicos, apresenta correlação com dados objetivos e tem a sensibilidade de identificar modificações no quadro clínico do paciente, a partir da intervenção cirúrgica.

Palavras Chave: Uretroplastia, resultados relatados pelos pacientes, qualidade de vida, estenose de uretra