$\star$  CONSURO DE MEDICAMENTOS POR GESTANTES ENTRE 2e E 29 ANOS DE IDADE. Bezerra RC, Gritti LA, Sobreiro BP, Garcias GL, Roth HGH (Depto. de Zoologia e Genética da UFPel) Agência Financiadora: FAPERGS

A faixa de idade situada entre os 20 e29 anos  $\acute{e}$  c siderada o período mais propício para a gesta ão e•virtude de já ter sido alcan, ada  $\acute{a}$  maturfirade psicofisiológica. Essa faixa etária representa  $\acute{a}$ •aior parcela da popula, ão de gestantes. Na presente analise, utilizando dados parciais derivados de 945 nascilentos consecutivos ocorridos na rede hospitalar da cidade de Pelotas no período de janeiro-e fevereiro de 1992, pretendelos descrever o colportalento do consumo de ledicamentos por essas gestantes. Foram utilizados e•1édia de 3,4 princípios ativos <PA> por •ãe, sendo que 64,3X delas fizera•uso de até 3 PA diferentes. Em rela,ão ao período gestacional, no 1o. trilestre fora•utilizados 21,3X dos ledicamentos, no segundo 35.1X  $\acute{e}$  no terceiro 43,6X. Esse aumento foi estatisticamente significativo, não ficando a cargo de nenhut grupo terapêutico isoladalente. Os três grupos terapêuticos mais utilizados fora•os ledicamentos ativos no metabolismo (61X>, os analgésicos, antiinflamatórios e antipiréticos <12,2X>  $\acute{e}$  os antiinfeccio os sistémicos (7,bY.>, os quais solados correspondet a aproximadamente 80X dos ledicaaentos por essas gestantes.