

**P 4461**

**Nível de dor de pacientes submetidos à artroplastia total de quadril de acordo com a classificação dos resultados de enfermagem**

Bruna Engelman, Mariana Palma da Silva, Manoela Schmarczek Figueiredo, Thalita Santos, Vanessa Mantovani, Alba Luz Rodríguez Acelas, Marcos Barragan, Maria do Carmo Rocha Laurent, Amália de Fátima Lucena, Miriam de Abreu Almeida  
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

**INTRODUÇÃO:** A Artroplastia Total de Quadril (ATQ) consiste na substituição da articulação por uma prótese. Após a cirurgia, os pacientes apresentam melhora na qualidade de vida, na capacidade funcional e diminuição da dor. Na instituição do estudo, o Diagnóstico de Enfermagem (DE) Dor aguda foi um dos mais frequentemente identificados para estes pacientes. Cabe ao enfermeiro avaliar a dor lançando mão de diferentes instrumentos. Neste sentido, foi desenvolvida a *Nursing Outcomes Classification* (NOC), que é uma classificação de resultados sensíveis às intervenções de enfermagem. Cada resultado de enfermagem (RE) da NOC contém indicadores e escalas de mensuração. **OBJETIVO:** Avaliar o Nível de dor de pacientes submetidos à ATQ por meio da NOC. **METODOLOGIA:** Estudo longitudinal com pacientes em pós-operatório de ATQ, idade  $\geq 18$  anos, de ambos os sexos e que concordaram em participar do estudo. A avaliação da dor foi realizada em quatro dias consecutivos, de fevereiro a junho de 2015. Aplicou-se instrumento construído pelos pesquisadores contendo o RE Nível de dor e nove indicadores com suas respectivas definições conceituais e operacionais, quais sejam: dor relatada, duração dos episódios de dor, expressões faciais de dor, encolhimento, agitação, irritabilidade, náusea, distúrbio do sono e diaforese. Eles foram avaliados por meio de escalas Likert da NOC, que varia de Grave (1) a Nenhum. Utilizou-se estatística descritiva para análise dos dados. **RESULTADOS:** Avaliaram-se 25 pacientes, predominantemente do sexo feminino (52%), brancos (88%), idade média 57,12 ( $\pm 6,36$ ). Dos nove indicadores selecionados, dois deles evoluíram: Dor relatada passou de Leve (média = 3,88) no primeiro dia, para Nenhum (média = 4,81) no último dia e Duração dos episódios de dor mudou de Moderado (média=3,72) no primeiro dia para Leve (média=4,29) no último. Os demais indicadores não apresentaram diferença estatística ao longo das avaliações. **CONCLUSÕES:** A NOC possibilitou avaliar a dor dos pacientes submetidos à ATQ, ao evidenciar melhora Nível de dor. Novas pesquisas são necessárias acerca desta classificação a fim de selecionar indicadores que demonstrem a eficácia das intervenções de enfermagem. CEP/HCPA. Palavras-chaves: Prótese de quadril, avaliação de resultados, dor aguda. Projeto 11-0601