



VARICELA EM UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Departamento de Enfermagem Materno Infantil da Escola de Enfermagem da UFRGS

Carolina Charão da Silva e Camila Marques

Orientadora Dr Nair Regina Ritter Ribeiro

Durante as atividades de extensão em uma Escola de Educação Infantil (EEI) houve um surto de Varicela atingindo nove crianças.

O QUE É: Varicela ou a popular Catapora é uma doença infecciosa facilmente transmissível causada pelo vírus *Varicella-Zoster*, mas é passível de prevenção através de imunização ativa.

SINTOMAS: A partir do momento em que o vírus invade o corpo ele começa a se reproduzir gerando, por conseguinte reações inflamatórias como, por exemplo, picos febris, mal estar, cefaléia, perda de apetite, erupções na pele.

MODO DE TRANSMISSÃO: A transmissão se dá a partir de contato com secreção nasofaringeas.

PERÍODO DE CONTÁGIO - O período de transmissão inicia 24 a 48 horas antes do surgimento das lesões da pele e se estende até que todas as vesículas tenham desenvolvido crostas (casca), usualmente sete a nove dias.

CONDUTA

- Afastamento das crianças acometidas por varicela;
- Revisão da literatura;
- Orientação das educadoras e familiares;
- Notificação ao Setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde Porto Alegre;
- Recomendação de imunização das crianças não acometidas pela doença;
- Supervisão do retorno das crianças às atividades da escola mediante liberação do pediatra e sem qualquer erupção dérmica.

CONSIDERAÇÕES

Acredita-se que os casos de varicela só diminuirão quando a vacina for inserida no calendário básico das crianças e disponibilizada gratuitamente para a população.

