

## **Remoção Cirurgica de Odontoma Complexo:um relato de caso clínico**

Coordenador: PANTELIS VARVAKI RADOS

Autor: Bernardo Salim Silveira

Os odontomas são os tipos mais comuns de tumores odontogênicos. Os odontomas subdividem-se nos tipos composto e complexo. Sua prevalência é maior do que a de todos os outros tumores odontogênicos somados. O odontoma composto é formado por muitas estruturas pequenas semelhantes a dentes enquanto o complexo consiste em uma massa aglomerada de esmalte e dentina, que não lembra morfologia de dente. Odontomas compostos são diagnosticados com maior frequência que os odontomas complexos. A média de idade no momento do diagnóstico dos odontomas é de 14 anos e eles ocorrem com maior frequência na maxila do que na mandíbula. Frequentemente, um dente incluso encontra-se associado com o odontoma, e este evita a erupção do dente. Os aspectos radiográficos são suficientes para o diagnóstico, e raramente um odontoma composto é confundido com qualquer outra lesão, entretanto, um odontoma complexo pode ser confundido radiograficamente com um osteoma ou alguma outra lesão óssea calcificada. Os principais objetivos desse trabalho são informar o público sobre a ocorrência de odontomas, suas principais características, suas formas de ocorrência, consequência da não remoção dos mesmos além de relatar um caso clínico de uma paciente que apresenta um odontoma composto na região anterior de maxila com consequente retenção do dente 11 cuja região foi submetida a um procedimento cirúrgico para a remoção da lesão. O procedimento foi realizado no terceiro andar da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) no ambulatório de Cirurgia e Traumatologia Bucocomaxilofacial (CTBMF) utilizando-se técnicas operatórias baseadas em evidências com acompanhamento do professor orientador e auxílio de uma acadêmica que cursa o sexto semestre da Faculdade de Odontologia. A paciente apresentou bom pós-operatório com pouco edema e dor fraca à moderada. Será feito o acompanhamento radiográfico da erupção do dente 11. Caso a erupção não ocorra, será estudada a possibilidade de se fazer um tracionamento ortodôntico. Acredita-se que a remoção do odontoma composto é essencial para que se possa esperar uma erupção espontânea do dente retido da paciente ou possibilitar a realização de um possível tracionamento ortodôntico.