



Evento	Salão UFRGS 2018: SIC - XXX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2018
Local	Campus do Vale - UFRGS
Título	COMPARAÇÃO ENTRE O CUIDADO PARENTAL RECEBIDO DURANTE A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E OS SINTOMAS MATERNOS DE DEPRESSÃO APÓS O PARTO
Autor	BRUNA PEZZINI CORRÊA
Orientador	MARCELO ZUBARAN GOLDANI

COMPARAÇÃO ENTRE O CUIDADO PARENTAL RECEBIDO DURANTE A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E OS SINTOMAS MATERNOS DE DEPRESSÃO APÓS O PARTO

Autor: Bruna Pezzini Corrêa

Orientador: Marcelo Zubarán Goldani

Instituição de Origem: Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS

INTRODUÇÃO: Sabe-se que o relacionamento entre pais e filhos é um fator importante no desenvolvimento da saúde mental na infância e na adolescência. Uma relação não saudável neste período aumenta a chance de desenvolver depressão ou ansiedade no adulto (BURNS et al. 2018). **OBJETIVO:** Comparar o efeito do cuidado parental na infância e adolescência com os sintomas depressivos maternos após o parto. **METODOLOGIA:** Estudo observacional longitudinal, parte do projeto intitulado “Impacto das Variações do Ambiente Perinatal sobre a Saúde do Recém-Nascido nos Primeiros Seis Meses de Vida” (BERNARDI et al. 2012), aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Hospital Fêmeina do Grupo Hospitalar Conceição pelos protocolos 11-0097 e 11-027, respectivamente. Selecionou-se, entre 24 e 48 horas após o parto, puérperas residentes em Porto Alegre. Os questionários PBI (Parental Bonding Instrument) e EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) foram auto-aplicados na entrevista que ocorreu aos três meses após o parto. O PBI é um questionário tipo Likert de 25 itens, cuja resposta tem quatro alternativas, que avalia a percepção do vínculo da entrevistada com sua mãe durante infância e adolescência. É dividido em dois constructos: Cuidado (ponto de corte de 27,0) e Superproteção (ponto de corte de 13,5). O EPDS também é um questionário tipo Likert de 10 itens, cuja resposta tem quatro alternativas e é utilizado para avaliar o nível de depressão pós-parto. Quanto maior o resultado, maior o nível de depressão. Valores acima de 10 são considerados altos. Utilizou-se o teste Mann-Whitney de amostras independentes para comparar o EPDS e os dois constructos do PBI. As variáveis categóricas foram expressas por número absoluto e relativo. As variáveis contínuas foram descritas por média±desvio padrão, quando paramétricas, ou mediana e intervalo interquartil, quando não paramétricas. O nível de significância adotado foi menor que 0,05. **RESULTADOS:** A mediana de idade materna foi 25,00 [21,00 – 31,00] anos e a de escolaridade materna foi 10,00 [8,00 – 11,00] anos. 60,2% das mães eram brancas. As medianas foram: EPDS = 4,00 [2,00 – 8,00]; Cuidado do PBI = 27,00 [19,00 – 32,00] e Superproteção = 18,00 [12,00 – 23,00]. A comparação entre EPDS e PBI foi significativa para o constructo Cuidado ($P < 0,001$) e apresentou tendência para o constructo Superproteção ($P = 0,053$). **CONCLUSÃO:** O tipo de cuidado parental recebido na infância influenciou a presença dos sintomas depressivos da mãe após o parto.