

CARACTERIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR ABCESSO NA DESOSSA DE CARÇAÇAS EM FRIGORÍFICO DE SUÍNOS

Mariáh Negri Musskopf & Rafael da Rosa Ulguim

Setor de Suínos, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

INTRODUÇÃO

Existem diversas causas para a condenação total ou parcial de carcaças. Dentre elas, a ocorrência de abscessos é comumente observada, podendo estar localizados na carcaça ou em vísceras. A observação dessas lesões leva a perdas econômicas devido ao retalhamento de cortes ou pela condenação da carcaça inteira. Nesse sentido, esse estudo surgiu a partir da demanda de uma unidade frigorífica de suínos, fiscalizada pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF), e teve como objetivo avaliar a ocorrência de condenações por abscessos durante a desossa das carcaças.

MATERIAIS E MÉTODOS

JAN
2013



Estudo retrospectivo (banco de dados de condenações do SIF)

15.397 lotes (~80.000 animais/mês)

64.016 indivíduos desviados para o Departamento de Inspeção Final

ABR
2018

✓ **Ocorrência** ✓ **Frequência** ✓ **Localização**

Os dados foram analisados através do software SAS 9.4® (análises descritivas de frequência)

RESULTADOS

Em média $915 \pm 81,5$ suínos/mês são condenados por abscesso, representando 1,14% dos animais abatidos no mês. Quando analisados todos os anos comparativamente, foi observado um percentual crescente de condenação por abscesso (Tabela 1). Do total de indivíduos avaliados, as condenações por abscesso representaram 85,46% no período do estudo e o corte que mais apresentou lesão por abscesso foi a sobrepaleta (90,3%), seguido pela paleta (3,48%) e pelo pernil (2,47%). Não foi possível identificar, a partir do banco de dados, as possíveis causas para ocorrência de tal problema no período de tempo observado.

Tabela 1. Percentual de condenações por abscesso de suínos abatidos em unidade frigorífica fiscalizada pelo SIF no RS

ANO	% CONDENAÇÕES POR ABCESSO
2013	0,37
2014	0,95
2015	0,89
2016	1,79
2017	1,46
2018	1,92



FORTE: GERMANO MUSSKOPF

Figura1. Imagem de abscessos encontrados em suínos abatidos

CONCLUSÃO

Os resultados desse estudo permitem concluir que abscesso é a lesão mais frequentemente observada na desossa de carcaças suínas, e que há um aumento crescente no percentual de condenações por abscesso nos últimos anos. Estudos adicionais são necessários para determinar os principais fatores envolvidos na alta prevalência dessa lesão nos últimos anos.