



<b>Evento</b>	Salão UFRGS 2018: SIC - XXX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
<b>Ano</b>	2018
<b>Local</b>	Campus do Vale - UFRGS
<b>Título</b>	Tratamento de TDAH em Adultos: Avaliação da Resposta em Sintomas de Oposição e Desafio
<b>Autor</b>	PAULA BLAYA ROCHA
<b>Orientador</b>	CLAITON HENRIQUE DOTTO BAU

## **Tratamento de TDAH em Adultos: Avaliação da Resposta em Sintomas de Oposição e Desafio**

**Aluna: Paula Blaya Rocha Orientador: Claiton Dotto Bau**

**UFRGS/ FAPERGS**

**Introdução** – O tratamento com Metilfenidato (MFD) do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) em adultos apresenta evidencia robusta de efetividade, representada pela melhora global dos seus sintomas. Não obstante, o efeito terapêutico do MFD sobre as suas comorbidades não é igualmente compreendido. Neste cenário, este estudo tem como objetivo avaliar a resposta ao tratamento com MFD em pacientes adultos com TDAH que apresentam sintomas de Transtorno de Oposição e Desafio (TOD), bem como fatores associados a essa resposta.

**Amostra** - Este é um estudo de seguimento naturalístico, de uma amostra por conveniência, composta por 629 adultos com TDAH avaliados no ambulatório de TDAH do HCPA. Após a exclusão de indivíduos que abandonaram prematuramente o tratamento com MFD (n=341), a amostra final foi de 288 pacientes. O desfecho primário deste estudo foi a variação dos sintomas de TOD medidos pelo questionário SNAP-IV, pré e pós tratamento com MFD. Nesta análise foi utilizado um teste t de amostras dependentes e um modelo de regressão linear múltipla.

**Resultados** – Foi verificada uma redução nos sintomas totais de TOD de 53% ( $p<0,001$ ). Nas dimensões “Humor Irritável” e “Comportamento desafiador/Vingativo”, esta diminuição foi de 50% ( $p<0,001$ ) e de 56% ( $p<0,001$ ), respectivamente. Um maior número de sintomas de TOD e TDAH antes do uso de MFD estão associados a uma melhor resposta dos sintomas gerais de TOD e de suas dimensões. O uso de nicotina e o sexo do paciente estão associados a diferenças nas respostas no grupo “Comportamento desafiador/Vingativo” e “Humor Irritável”, respectivamente.

**Conclusões** – Sintomas de TOD em adultos com TDAH não são amplamente difundidos. Visando preencher esta lacuna, os resultados deste trabalho indicam que há uma melhora global nos sintomas de TOD e de suas dimensões quando pacientes adultos com TDAH são tratados com MFD. Ainda, tal resposta demonstrou diferentes associações conforme as distintas apresentações de sintomas de TOD.