



**Universidade:  
presente!**

**UFRGS**  
PROPEAQ



**XXXI SIC**

21. 25. OUTUBRO • CAMPUS DO VALE

<b>Evento</b>	Salão UFRGS 2019: SIC - XXXI SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
<b>Ano</b>	2019
<b>Local</b>	Campus do Vale - UFRGS
<b>Título</b>	Bichectomia: Série de casos para avaliação da funcionalidade da técnica operatória e acompanhamento das mudanças faciais
<b>Autor</b>	CAROLINE SCHUQUEL RITTER
<b>Orientador</b>	ANGELO LUIZ FREDDO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  
FACULDADE DE ODONTOLOGIA

BICHECTOMIA: SÉRIE DE CASOS PARA AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DA  
TÉCNICA OPERATÓRIA E ACOMPANHAMENTO DAS MUDANÇAS FACIAIS

**Caroline Schuquel Ritter**

Orientador: Angelo Luiz Freddo

Coorientador: Adriana Corsetti

**RESUMO**

Na atualidade, os conceitos de beleza têm se voltado cada vez mais pela busca de um rosto com aparência mais magra e delineada. A partir disso, inúmeras técnicas foram criadas com o intuito de alcançar esse objetivo. Dentre elas, podemos citar: a lipoaspiração facial; a injeção de lipólise e a remoção parcial da bola de bichat, esta última pouco relatada na literatura.

Recentemente houve uma popularização da bichectomia, sendo realizada, por inúmeros profissionais, mas com vários relatos de intercorrências ou de pobres resultados frente às expectativas. Dessa forma, o objetivo do presente estudo é avaliar a funcionalidade da técnica cirúrgica de remoção parcial bilateral das bolas de bichat a curto, médio e longo prazo. Avaliou-se a aplicabilidade da técnica, a satisfação dos participantes da pesquisa, possíveis intercorrências transoperatórias e complicações pós-operatórias.

O presente estudo foi realizado na Faculdade de Odontologia da UFRGS e se consistiu em uma série de casos, realizado bilateralmente nos participantes da pesquisa em uma amostra voluntária de dez indivíduos, para remoção cirúrgica parcial das bolas de bichat. A seleção dos participantes foi por conveniência, no qual a partir da procura dos mesmos, foram escolhidos os casos que se enquadraram nos critérios de inclusão do estudo. Os interessados passaram por anamnese e exame físico. Os indivíduos selecionados tiveram a mensuração de seu peso corporal e de seus perímetros faciais (região onde a bola de bichat está localizada) no período pré-operatório e nos períodos pós-operatórios. Previamente ao procedimento, foi aferida a pressão arterial e após o procedimento, as bolas de bichat foram mensuradas com o uso de seringa milimetrada.

Os resultados foram analisados por meio da avaliação física, fotográfica e satisfação do participante da pesquisa.