



**Universidade:
presente!**

UFRGS
PROPEAQ



XXXI SIC

21. 25. OUTUBRO • CAMPUS DO VALE

Evento	Salão UFRGS 2019: SIC - XXXI SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2019
Local	Campus do Vale - UFRGS
Título	MENTALIZAÇÃO E PSICOPATOLOGIA NA POPULAÇÃO GERAL
Autor	JOÃO VITOR BARBOZA CARDOSO
Orientador	DIEGO LUIZ ROVARIS

MENTALIZAÇÃO E PSICOPATOLOGIA NA POPULAÇÃO GERAL

Autor: João Vitor Barboza Cardoso

Orientador: Diego Luiz Rovaris

Instituição: Programa de Transtornos de Déficit de Atenção/Hiperatividade (ProDAH) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

Mentalização refere-se à capacidade individual de entender a si próprio e aos outros em termos de emoções, comportamentos e crenças. A mentalização está associada à psicopatologia e a qualidade da cognição social, entretanto, essas associações têm sido pouco estudadas na população geral. Em contextos de pesquisa, o modo operativo de avaliar a mentalização é a partir da medida da função reflexiva (RFQ). Este estudo tem como objetivo avaliar a mentalização a partir do uso do Questionário de Função Reflexiva (RFQ-8), que resulta em uma dimensão com dois pólos (certeza e incerteza). A amostra avaliada até o momento incluiu 418 indivíduos, que responderam ao RFQ-8 e foram avaliados a partir de um screening psiquiátrico no banco de sangue do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Os screenings positivo para Transtorno de Oposição e Desafio, Transtorno por Uso de Substâncias, Transtorno por Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno Depressivo Maior, Transtorno Bipolar (TB), Transtornos de Ansiedade e Psicoses foram significativamente associados com incerteza. Entretanto, em um modelo múltiplo, somente TDAH e TB se mantiveram significativos. Os resultados preliminares desse estudo sugerem que o RFQ-8 é uma ferramenta útil para avaliar mentalização em amostras populacionais, já que corroborou achados obtidos em amostras clínicas. Além disso, TDAH e TB foram significativamente associadas com um estado de hipomentalização, atenuando os efeitos dos demais transtornos em um modelo estatístico incluindo todos os screenings testados. Esse trabalho continua em andamento, com o intuito de aumentar o tamanho amostral.