



# VII Simpósio do Processo de Enfermagem do HCPA



*"Revelando novas fronteiras e Tecnologias"*



*Nossa missão é cuidar de você*



# Anais

Data: 25 e 26 de agosto de 2014  
Local: Anfiteatro Carlos César de Albuquerque

**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE  
ESCOLA DE ENFERMAGEM - UFRGS**

# **VII Simposio do Processo de Enfermagem**

do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

*"Revelando novas fronteiras e tecnologias"*

**25 e 26 de agosto de 2014**

**Local**

Anfiteatro Carlos César de Albuquerque  
Hospital de Clínicas de Porto Alegre  
Porto Alegre – RS

## **APLICAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM EM PACIENTE ADMITIDO EM EMERGÊNCIA COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO: ESTUDO DE CASO**

Vanessa Monteiro Mantovani, Carine Lais Nonnenmacher, Christiane Wahast Ávila,  
Clarissa Bohrer

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

**Introdução:** A aplicação do Processo de Enfermagem (PE) possibilita a organização e padronização da linguagem. No contexto de pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM), seu uso auxilia na escolha apropriada dos cuidados de enfermagem. **Objetivo:** Aplicar o PE no cuidado a um paciente admitido em unidade de emergência (UE) com diagnóstico de IAM, descrevendo diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem prioritárias. **Métodos:** Estudo de caso clínico descritivo realizado em hospital universitário. O paciente do estudo foi admitido em UE e diagnosticado com IAM. A coleta de dados ocorreu por meio de exame clínico, revisão de prontuário e consulta à literatura. Utilizaram-se as taxonomias NANDA, NOC e NIC para a escolha dos diagnósticos, resultados e intervenções. **Resultados:** Paciente masculino, 70 anos. Ao exame físico, mostrava-se hipocorado, ansioso, sudorético, faces de dor. Ventilava em ar ambiente e apresentava leve dispneia. Ritmo cardíaco irregular, com 3ª bulha. Ruídos estertores em bases. Extremidades pouco aquecidas, edema 2+. Sinais vitais: PA 100/70mmHg, FC 140bpm, FR 24mrm, Tax 36,3°C, dor torácica em aperto de intensidade 9. O primeiro diagnóstico de enfermagem (DE) eleito foi Dor aguda, sendo os resultados esperados Nível de dor e Nível de estresse. Para alcançar estes resultados foram elencadas as intervenções Administração de analgésicos e Redução da ansiedade. O segundo DE selecionado foi Débito cardíaco diminuído, sendo os resultados Sinais vitais, Estado circulatório e Eficácia da bomba cardíaca. Para o alcance destes, as intervenções escolhidas foram Cuidados cardíacos: fase aguda e Regulação hemodinâmica. **Conclusões:** O uso do PE pode auxiliar os enfermeiros atuantes em UE na realização do pensamento crítico, tomada de decisão e qualificação da assistência prestada a pacientes que sofreram IAM. **Descritores:** Processos de Enfermagem; Infarto do Miocárdio; Cuidados de Enfermagem.