



**XXXIII SIC** SALÃO INICIAÇÃO CIENTÍFICA

<b>Evento</b>	Salão UFRGS 2021: SIC - XXXIII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
<b>Ano</b>	2021
<b>Local</b>	Virtual
<b>Título</b>	PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DA ESCALA INTEGRARE ADAPTADA TRANSCULTURALMENTE PARA USO NO BRASIL
<b>Autor</b>	ANA CAROLINA FIORAVANTI EILERT DA SILVA
<b>Orientador</b>	AMÁLIA DE FATIMA LUCENA

## PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DA ESCALA INTEGRARE ADAPTADA TRANSCULTURALMENTE PARA USO NO BRASIL

Ana Carolina Fioravanti Eilert da Silva

Justificativa: Lesão por pressão (LP) é um dano na pele e/ou tecidos moles subjacentes, de origem multifatorial, é um dos principais eventos adversos preveníveis nos serviços de saúde. O uso de escalas de predição de risco e sistemas de classificação de enfermagem são ferramentas importantes que contribuem no apoio à decisão da prática clínica. A Escala INTEGRARE, elaborada por pesquisadores espanhóis, é baseada nos indicadores da *Nursing Outcomes Classification* (NOC) e foi validada em seu país de origem como instrumento para avaliação do risco da LP, baseada nas características dos pacientes e como estas podem influenciar seus resultados de saúde. A mesma foi recentemente adaptada transculturalmente para o português do Brasil, porém, também necessitando de avaliação de suas propriedades psicométricas. Objetivos: Avaliar as propriedades psicométricas da escala INTEGRARE adaptada transculturalmente para uso no Brasil. Metodologia: Estudo metodológico, com avaliação de propriedades psicométricas (confiabilidade e validade convergente). Amostra de 120 pacientes adultos hospitalizados nas unidades clínicas e cirúrgicas de um hospital universitário no sul do Brasil, avaliados a beira leito no primeiro dia de admissão. Para validade convergente foi considerada a Escala de Braden como padrão-ouro. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição. Resultados: Dentre os pacientes, 61 (50,8%) eram do sexo feminino, com média de 57,66 ( $\pm$  17,36) anos de idade, sendo HAS (52,5%) a principal comorbidade e causa cirúrgica (57,5%) o motivo de internação mais frequente. Quanto à confiabilidade, a consistência interna apresentou Alfa de *Cronbach* questionável ( $\alpha=0,63$ ). Em relação à validade convergente, a INTEGRARE obteve correlação significativa, positiva e forte ( $\rho=0,741$ ;  $p<0,001$ ) com a Braden. Embora a consistência interna tenha sido questionável, a INTEGRARE apresentou uma validade convergente forte e positiva, indicando sua validade para predizer o risco de LP.