

20a. Semana Científica do HCPA - Anais de 2000 - CD HCPA

122 - AVALIAÇÃO DA DEMANDA DE SEPARAÇÃO ESPACIAL PARA PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DE INFECÇÕES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

HOEFEL HHK, GLANZNER C, KONKEWICZ NM, KONKEWICZ L, TORRIANE M

Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. HCPA - UFRGS

O isolamento de pacientes infectados em quartos individuais é uma das estratégias para prevenção de infecções. Objetivo: avaliar o atendimento à demanda de separação espacial de pacientes mais suscetíveis a infecção e de pacientes com infecções de maior transmissibilidade no HCPA. Material e métodos: estudo prospectivo no período de novembro de 1998 a setembro de 1999, da indicação de quartos individuais para pacientes das unidades de internação e emergência de adultos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Resultados: 294 solicitações de quartos individuais, 187 da emergência, 94 da internação e 13 de outras áreas. Pacientes com tuberculose tiveram 138 (46%) solicitações; com neutropenia tiveram 131 (44%) solicitações. Destas 87 (29,6%) eram para pacientes que tinham também SIDA. Em 197 ocasiões (66,7%) os leitos foram conseguidos. 98 (33,3%) pacientes tiveram alta, morreram ou melhoraram da neutropenia ou descartou-se a suspeita de transmissão antes da solução. A espera variou de 1 a 3 dias. Das 196 solicitações atendidas 85 (43,4%) foram tuberculose e 93 (47,4%) neutropenia. Bloqueio de leitos ocorreu em 14 ocasiões (7,1%) e em 25 (12,8%) compartilhamento de enfermaria. Das 196 atendidas, 60 (30,6%) eram pacientes com SIDA e necessidade de quarto individual: 51 quartos individuais, 5 compartilharam quarto e 4 bloquearam leito. Os pacientes com SIDA tiveram 70% dos atendimentos. Conclusão: tuberculose e neutropenia dominaram a demanda de leitos, com grande parte destes com diagnóstico de SIDA. Há necessidade de maior oferta de leitos na rede pública para prevenção da transmissão cruzada de infecções.