



26º Encontro Internacional de Audiologia

17 a 20 de abril de 2011
Maceió - Alagoas



ACADEMIA
BRASILEIRA DE
AUDIOLOGIA

APRESENTAÇÃO

ORGANIZAÇÃO

LOCAL DO EVENTO

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

FEIRA TECNOLÓGICA

HOSPEDAGEM

PASSEIOS TURÍSTICOS

FALE CONOSCO

AGENDA BOLETIM INFORMATIVO

Acompanhe as últimas
informações sobre o
26º EIA.

[Saiba mais.](#)



FEIRA TECNOLÓGICA

Uma oportunidade
para apresentar produtos
e serviços ao mercado.

[Garanta já
o seu espaço.](#)



INSCRIÇÕES

Aproveite até o dia
31 DE MARÇO para realizar
a sua inscrição no evento em
até 02 (duas) vezes sem juros
nos cartões de crédito **VISA** ou
MASTERCARD.

[Clique Aqui](#)



Posters

Avaliação / Reabilitação Vestibular

P3004 - ASSOCIAÇÃO ENTRE TONTURA E SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA EM IDOSOS NÃO INSTITUCIONALIZADOS

Apresentador : Adriane Ribeiro Teixeira /

Autor(es) / Coautor(es) : Teixeira, A.R.; Gonçalves, A.K.; Freitas, C.L.R.; Santos, A.M.P.V.; Olchik, M.R.; Levy, D.S.; Dornelles, S.; Gomes, E.

Introdução: A tontura pode ser descrita como uma ilusão de movimento do indivíduo ou do ambiente. Dentre as causas mais comuns estão os distúrbios vestibulares. Pode prejudicar a qualidade de vida e estar associada a problemas psicológicos, tais como a depressão e a ansiedade. Objetivo: verificar a existência de associação entre tontura e sintomatologia depressiva em idosos, bem como analisar a influência da variável sexo. Metodologia: A amostra foi composta por indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos, participantes de um projeto de extensão. Todos responderam a anamnese e a Escala de Depressão Geriátrica (GDS) versão reduzida (15 itens). Este instrumento é amplamente utilizado com a população idosa para o rastreamento de sintomatologia depressiva. Resultados: fizeram parte da amostra 78 idosos, de 60 a 84 anos (média de idade $69,76 \pm 6,82$ anos), sendo 37 (47,4%) do sexo masculino e 41 (52,6%) do sexo feminino. A queixa de tontura foi referida por 30 idosos (38,5%), sendo 12 (15,4%) do sexo masculino e 18 (23,1%) do sexo feminino. A análise dos resultados da GDS evidenciou que 28 (35,9%) idosos apresentavam sintomatologia depressiva, 10 (12,8%) do sexo masculino e 18 (23,1%) do sexo feminino. Quanto a gravidade dos sintomas, 25 idosos (32,1%) apresentavam sintomatologia depressiva leve a moderada e 3 (3,8%) sintomatologia depressiva grave. A análise estatística permitiu verificar que não houve associação entre o sexo e queixa de tontura ($p=0,2$) e entre o sexo e a presença de sintomatologia depressiva ($p=0,1$), contrariando os dados da literatura especializada. Constatou-se, contudo, que houve associação entre a queixa de tontura e a presença de sintomatologia depressiva ($p=0,000^*$). Conclusão: no grupo de idosos avaliados, observou-se associação entre a queixa de tontura e a presença de sintomatologia depressiva. O sexo não foi uma variável que influenciou nos resultados obtidos.

Dados de publicação

Página(s) : p.3004

URL (endereço digital) : http://www.audiologiabrasil.org.br/eiamaceio2011/anais_select.php?eia=&pg=poster&cid=3004

ISSN : 1983-179X