

314

**A PRÁTICA NO USO DE CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) EM NEONATOLOGIA.** *Elizane Giordani Lemos, Thanize Prates da Rosa, Carol Giordani da Silva, Dionéia Sparremberger, Andréia Tompsen, Maria da Graça Oliveira Crossetti (orient.) (IPA).*

Ao longo de décadas a assistência de enfermagem vem incorporando às suas atribuições novas técnicas buscando aprimoramento dos cuidados avançando dia a dia responsabilidades com a preocupação de oferecer o melhor resultado e menor risco ao paciente. Nesta busca, a melhor opção atualmente encontrada com durabilidade, segurança aos pacientes hospitalizados e em home care é o Cateter Central de Inserção Periférica CCIP / PICC – Peripherally Inserted Central Catheter. O objetivo deste estudo é apresentar, a comunidade acadêmica o uso do cateter PICC em neonatologia e suas particularidades. O PICC é um dispositivo vascular de inserção periférica com localização central, de lúmen único ou duplo. O termo central refere-se à localização da ponta do cateter que deve estar no terço inferior da veia cava superior, o sua termoestabilidade permite a infusão dos medicamentos, como drogas vesicantes e irritantes sem danificar veias. É de total importância para os neonatos que utilizam o cateter por período de médio e longo prazo evitando com isso punções repetitivas e diminuindo o manuseio com recém-nascido. Os profissionais envolvidos na inserção do cateter são amparados pela resolução do Conselho Federal de Enfermagem 258/2001. A metodologia aplicada para a realização deste estudo foi através de referencial teórico embasado nas práticas do cotidiano de trabalho de enfermeiros assistencial de uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Espera-se através desse trabalho aprimorar os conhecimentos em relação ao PICC um avanço tecnológico no que diz respeito à terapia intravenosa.