

Sessão 58  
ODONTOLOGIA II

477

**ALTERAÇÕES NOS PARÂMETROS CLÍNICOS INFLAMATÓRIOS SUBGENGIVAIS DURANTE A GESTAÇÃO.** *Eduardo Boero Daudt, Tiago Fiorini, Marta Liliana Musskopf, Cassiano Kuchenbecker Rösing, José Mariano da Rocha, Patrícia Weidlich, Carlos Heitor Moreira, Rui Vicente Oppermann (orient.) (UFRGS).*

O objetivo deste estudo é avaliar as alterações dos parâmetros inflamatórios subgengivais durante a gravidez. Oitenta pacientes na faixa etária de 18-35 anos, até a 20ª semana de gestação, estão sendo selecionadas a partir da busca por atendimento pré-natal no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas em Porto Alegre. Mulheres com gravidez múltipla, apresentando indicação de profilaxia antibiótica para exame odontológico e portadoras de aparelho ortodôntico fixo são excluídas. Dois examinadores treinados e calibrados realizam o exame clínico em seis sítios de todos os dentes permanentes erupcionados, exceto 3º molares. Este exame é realizado até a 20ª semana de gestação (exame 1) e entre a 26ª e 28ª semanas gestacionais (exame 2). Os parâmetros inflamatórios subgengivais profundidade de sondagem (PS) e sangramento e supuração à sondagem (SS) estão sendo avaliados. A comparação dos valores médios de cada parâmetro para cada paciente é realizada através de teste t para amostras dependentes. O estudo encontra-se na fase de execução experimental. Os resultados parciais encontrados no exame de 63 pacientes mostram que não há diferenças na profundidade de sondagem nos dois momentos gestacionais avaliados, sendo a média de PS no exame 1 foi de 2,50 mm ( $\pm 0,36$ ) e no exame 2 foi de 2,54 mm ( $\pm 0,34$ ). Da mesma forma, a frequência média de sítios com presença de SS foi semelhante nos dois exames, 53,1% no exame 1 e 53,5% no exame 2. A partir dessa análise parcial, conclui-se que não há alteração nos parâmetros inflamatórios subgengivais nos períodos gestacionais avaliados. (PIBIC).