

A Mata Atlântica é um dos biomas mais ameaçados do planeta, representado principalmente por fragmentos florestais pequenos e isolados. Por este motivo levantamentos faunísticos são de grande importância, pois servem para avaliar o grau de conservação desses fragmentos. Outra importância reside no fato de que as aves atuam na manutenção de florestas como agentes polinizadores e dispersores de sementes. Localizado no município de Viamão, o Pontal do coco possui cobertura vegetal de mata secundária tardia nas áreas elevadas e campos antropizados e banhados nas áreas de baixada. O presente trabalho tem como objetivo caracterizar qualitativamente a avifauna ocorrente no local. Até o presente momento foram realizadas cinco campanhas, entre os meses de dezembro de 2008 e abril de 2009 totalizando um esforço de 65h. O levantamento foi realizado no período da manhã, entre 6h e 10h, e ao entardecer das 16h às 19h, baseando-se na identificação visual/auditiva, percorrendo os diversos ambientes visando constatar o maior número possível de espécies. Até o momento, foram registradas 134 espécies de aves distribuídas em 45 famílias. São registros relevantes: *Piculus aurulentus* (pica-pau-dourado) por se tratar de uma espécie quase ameaçada a nível global, *Sclerurus scansor* (vira-folha) por ser uma espécie sensível a alterações no meio e *Haplospiza unicolor* (cigarrinha-bambu) por estar relacionada com a frutificação de taquaras. Cinco espécies tiveram sua distribuição ampliada, sendo consideradas novos registros para a região: *Thalurania glaucopis* (beija-flor-de-frente-violeta), *Megarynchus pitangua* (neinei), *Turdus leucomelas* (sabiá-barranco), *Tachyphonus coronatus* (tiê-preto) e *Melanerpes candidus* (pica-pau-branco). Os resultados obtidos indicam que a área apresenta uma grande riqueza de aves, sendo a sua conservação importante para a manutenção de biodiversidade local e regional.