

124

**INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NIC - MAPEANDO CUIDADOS PREVALENTES PARA PACIENTES ORTOPÉDICOS.** *Vanessa Kenne Longaray, Paula de Cezaro, Miriam de Abreu Almeida (orient.) (UFRGS).*

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), vinculado academicamente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) introduziu o diagnóstico de enfermagem (DE) informatizado no ano de 2000 utilizando a North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), ao referencial teórico das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta. Os cuidados prescritos pela enfermeira a partir dos DE identificados não seguem um Sistema de Classificação de Enfermagem padronizado. É meta do Grupo de Enfermagem (GENF) da Instituição implantar a Classificação das Intervenções de Enfermagem – NIC. O objetivo deste estudo é mapear as prescrições de enfermagem, relativas aos três DE prevalentes no cuidado a pacientes ortopédicos adultos submetidos a Artroplastia Total de Quadril (ATQ) ou de Joelho (ATJ) no HCPA em 2003, associando-as às intervenções contidas na NIC. O processo de mapeamento das intervenções foi embasado nas regras básicas estabelecidas por Delaney e Moorhead. O projeto foi aprovado pela Comissão de Pesquisa e Ética em Saúde do HCPA. Em 2003, 170 pacientes realizaram ATQ ou ATJ no hospital universitário em estudo. Para os três DE prevalentes, quais sejam: *Déficit no Auto-Cuidado: banho e/ou higiene, Mobilidade Física Prejudicada e Risco para Infecção*, foram prescritos 46 cuidados de enfermagem. A grande maioria dos cuidados prescritos foi mapeada às atividades contidas em 28 intervenções de enfermagem da NIC. A interpretação do significado da palavra-chave e do contexto do cuidado foi regra essencial para o mapeamento consistente das intervenções. Este pequeno processo de mapeamento evidenciou que a NIC reflete a prática de enfermagem e que pode ser útil clinicamente ao constituir-se em um instrumento de consulta para aprimorar e fundamentar o cuidado de enfermagem.