

220

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PERCEVEJOS-DO-MATO (HEMIPTERA: PENTATOMOIDEA) NA FLORESTA NACIONAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA (FLONA) E VALE DO RIO MAQUINÉ, RS, BRASIL. *Luciana Maria Weiler, Augusto Ferrari,*

Jocelia Grazia (orient.) (UFRGS).

Os percevejos-do-mato fazem parte da superfamília Pentatomoidea sendo exclusivamente terrestres e fitófagos na maioria. O conhecimento da diversidade de pentatomóideos é, entretanto, incompleto, esparso e fragmentário. Esse trabalho tem como objetivo contribuir para o levantamento sistemático e o conhecimento da fauna de pentatomóideos do Rio Grande do Sul. O trabalho foi desenvolvido na Floresta Nacional de São Francisco de Paula e no Vale do Rio Maquiné, localidades que apresentam o bioma Mata Atlântica. As coletas foram realizadas em oito trilhas, quatro em cada localidade, com duas horas de duração cada. Foram utilizados rede de varredura, guarda-chuva entomológico e coleta manual. Até o momento foram obtidos, ao total, 237 exemplares na FLONA e 85 exemplares em Maquiné, pertencentes a 24 espécies em ambas as áreas. Na FLONA, as espécies/exemplares estão assim distribuídos: Acanthosomatidae (1/3); Cydnidae (3/20); Pentatomidae (18/211), nas subfamílias Edessinae (3/20) e Pentatominae (15/191); Scutelleridae (2/3). Em Maquiné, as espécies/exemplares estão assim distribuídos: Cydnidae (3/12), nas subfamílias Cydninae (1/2) e Corimelaeninae (2/10); Pentatomidae (20/72), nas subfamílias Asopinae (1/2), Edessinae (3/11) e Pentatominae (16/59); Phloeidae (1/1). Como os trabalhos de campo terão continuidade nos meses de julho a outubro de 2006, perfazendo duas amostragens de inverno e duas de primavera, os dados numéricos serão devidamente atualizados por ocasião da apresentação do trabalho no SIC.