

Sessão 11  
**Avaliação Psicológica**

090

**AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DE UM INDIVÍDUO DEPENDENTE DE ÁLCOOL.**  
*Francéia Veiga Liedtke, Jaqueline de Carvalho Rodrigues, Maria Alice de Mattos Pimenta Parente, Rochele Paz Fonseca, Antônio Jaeger (orient.) (UFRGS).*

Estudos neuropsicológicos anteriores indicam que o uso abusivo e crônico de álcool, assim como complicações clínicas causadas pelo mesmo, podem ser responsáveis por diversos prejuízos neuropsicológicos. As funções cognitivas mais comumente afetadas em alcoolistas são a memória, aprendizagem, funções executivas, tomada de decisões, desempenho psicomotor e percepção visuo-espacial. Em muitos casos os déficits tornam-se bastante severos, configurando demências e transtornos persistentes de memória. No presente estudo de caso, realizou-se uma avaliação neuropsicológica extensiva que teve como objetivo investigar a presença desses prejuízos cognitivos em um indivíduo com uso crônico de álcool, que apresentou recentemente sintomas da Síndrome de Wernicke. Os instrumentos utilizados para tal avaliação foram Wiscosin Card Sorting Test, Hayling Test, subtestes cubos, vocabulário, dígitos e aritmética pertencentes ao WAIS-III, Instrumento de Avaliação Neuropsicológica Breve NEUPSILIN, Bateria Montreal de Avaliação da Comunicação (Bateria MAC) e o Teste Stroop. Através dessa avaliação foi possível observar a presença de prejuízos significativos principalmente no que se refere às funções executivas, atenção, praxias construtivas e ideomotoras e percepção visuo-espacial. Déficit semelhantes não foram encontrados na memória, indicando que não houve o desenvolvimento da síndrome de Korsakoff. As funções executivas e a memória são funções fundamentais para o processo de reabilitação de dependentes de álcool, e a avaliação das mesmas se mostra uma peça determinante para o sucesso do tratamento.