

## **Avaliação da Deglutição em Lactentes Portadores de Cardiopatia Congênita: série de casos**

**OBJETIVO:** Descrever as alterações da deglutição em lactentes portadores de cardiopatias congênitas durante seu período de internação na UTI Pediátrica ou Unidade 2A no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul em Porto Alegre (IC/RS), bem como comparar os dados publicados na literatura sobre a incidência e prevalência da disfagia na população com os resultados obtidos na pesquisa.

**MÉTODOS:** Estudo de uma série de casos, realizado entre agosto e novembro de 2011, no Instituto de Cardiologia. A amostra foi composta por 10 pacientes submetidos à avaliação de deglutição. Os lactentes incluídos eram menores de sete meses com diagnósticos de cardiopatia congênita e com suspeitas de dificuldades de deglutição encaminhados ao serviço de fonoaudiologia do hospital. Foi utilizado protocolo de perfil da amostra, para a avaliação clínica da deglutição utilizou-se o protocolo proposto por Fujinaga et.al.

**RESULTADOS:** Dos 10 pacientes, 6 eram do gênero feminino. A idade variou de 20 dias a 6 meses e 7 dias, a média de idade foi de 3,5 com desvio padrão de 1,9. Destes, 8 lactentes apresentaram a disfagia orofaríngea, 2 tinham histórias de dificuldade prévia para mamar e 2 apresentaram aversão oral. Todos os lactentes com disfagia orofaríngea apresentaram incoordenação da sucção, da deglutição e da respiração. Os 8 lactentes eram pós-cirúrgicos e apenas 1 não precisou ser intubado. A disfagia orofaríngea ocorreu em 80% dos lactentes avaliados, os demais apresentaram deglutição normal.

**CONCLUSÕES:** A disfagia ocorre frequentemente em lactentes cardiopatas pós-cirúrgicos o que corrobora com a atual literatura publicada. Avaliações prospectivas futuras com um número maior de avaliações são necessárias para corroborar com a nossa série de casos, ou até mesmo investigar a ocorrência de disfagia orofaríngea no pré-cirúrgico e suas possíveis correlações com pós-cirúrgico.

**Palavras-chave:** Cardiopatias Congênitas; Lactentes; Transtorno de Deglutição.