

385

CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DOS MARSUPIAIS (MAMMALIA: DIDELPHIDAE) COM OCORRÊNCIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Eduardo Polanczyk, Diego M. Jung, Rafael C. Erling, Graciela B. Horn, Alexandre U. Christoff (orient.) (Departamento de Biologia,

Laboratório de Sistemática de Mamíferos, ULBRA).

No Rio Grande do Sul (RS) é relatada a ocorrência de pelo menos quinze espécies de marsupiais. Estas não têm recebido atenção no que diz respeito ao status taxonômico, aspectos ecológicos e distribuição geográfica no extremo sul do Brasil. Este trabalho tem por objetivo apresentar uma lista das espécies de marsupiais com ocorrência no estado, bem como caracteriza-las sob o ponto de vista anatômico. A ocorrência foi baseada em acervos de coleções científicas e em nossas coletas. O inventário das espécies bem como a inferência da distribuição geográfica foram prejudicados em decorrência da carência de espécimes em coleções no RS. Como resultados parciais tem-se: Oito espécies – *Chironectes minimus*, *Didelphys albiventris*, *Gracilinanus agilis*, *G. microtarsus*, *Lutreolina crassicaudata*, *Micoureus* sp., *Philander frenata* e *Monodelphis* sp. O registro de ocorrência é mais expressivo para a metade leste do estado região mais amostrada, sendo inexpressiva a documentação na região norte e oeste. A espécie *D. albiventris* tem ampla ocorrência, associada a diversos ambientes incluindo os com ação antrópica. *Chironectes minimus*, citada na Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção no RS, categoria vulnerável, está associada a cursos d'água, adaptada à vida semi-aquática. *Lutreolina crassicaudata* ocupa formações abertas e freqüentemente registrada na região da campanha gaúcha. *Gracilinanus agilis* e *G. microtarsus*, *Micoureus* sp. e *Philander frenata* possuem registros em diversas formações, desde Florestas Ombrófila Densa á áreas de Formação Pioneira e Estepe. Estes quatro táxons tem sido registrados em áreas florestadas com considerável grau de alteração. *P. frenata* foi registrado em matas íntegras e áreas cultivadas (bananais). O gênero *Monodelphis* tem sido registrado em diferentes regiões do estado, tanto no interior de áreas florestadas, bem como capoeira ou restevas em agroecossistemas.