

381

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DOS CASOS DE ESPOROTRICOSE DIAGNOSTICADOS NO SERVIÇO DE DERMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA -UFRGS.

Rodrigo Vettorato, Ana Cecília Michel da Rosa, Analupe Weber, Gerson Vettorato, Maria Lúcia Scroferneker, Roberto Lopes Gervini, Maria Lucia Scroferneker (orient.) (Departamento de Microbiologia, Instituto de Ciências Básicas da Saúde, UFRGS).

A esporotricose é uma infecção subaguda ou crônica causada pelo fungo dimórfico *Sporothrix schenckii*, apresentando-se como lesões nodulares do tecido cutâneo ou subcutâneo e linfáticos adjacentes. As características clínicas e epidemiológicas dos casos de esporotricose diagnosticados e tratados no serviço de Dermatologia da UFRGS - Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia foram estudadas retrospectivamente. Prontuários médicos dos últimos 35 anos foram revisados e analisados estatisticamente com auxílio do programa Epi Info 6.0 1b. Trezentos e quatro casos de esporotricose foram confirmados por exame micológico e/ou histopatológico. O maior número de Esporotricose diagnosticado no Serviço de Dermatologia ocorreu no período compreendido entre 1967 e 1990, com uma média de 10, 56 casos ao ano. Duzentos e dezenove pacientes residiam na região Metropolitana. Poucos eram procedentes de outras regiões, como sudeste (6, 6%), noroeste (6, 25%), centro –oriental (6, 25%), nordeste (4, 25%), sudoeste (3, 3%), ou centro-ocidental (1, 35%). Os dados demonstram que a maioria dos casos é procedente da região metropolitana, o que pode ser explicado pela maior densidade populacional da região. (FAPERGS/IC).