
REVISTA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE E
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

REVISTA HCPA 2005; 25 (Supl 1) :1-251



25^a Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre 12º Congresso de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Mercosul

Anais

REVISTA HCPA - Volume 25 (Supl 1) - Setembro 2005
International Standard Serial Numbering (ISSN) 0101-5575
Registrada no Cartório do Registro Especial de Porto Alegre sob nº 195 no livro B, n.2
Indexada no LILACS

A Correspondência deve ser encaminhada para: Editor da Revista HCPA - Largo Eduardo Zaccaro Faraco - Rua Ramiro Barcelos, 2350
90035-903 - Porto Alegre, RS - Tel: +55-51-2101.8304 - www.hcpa.ufrgs.br

LINFANGIOMA CÍSTICO DE MESENTÉRIO NA CRIANÇA: RELATO DE CASO

VALENTINA COUTINHO BALDOTO GAVA;FAVERO, E.; KAPPEL JUNIOR, G.; FRAGA, J.C.S.; DOS SANTOS, B.A.; GALAFFA, D.M.

INTRODUÇÃO Linfangiomas são lesões císticas originadas de uma malformação primária do sistema linfático. É freqüente na criança, contudo sua localização abdominal é rara. A apresentação clínica tem grande variabilidade. Os exames de imagem de eleição são a ecografia e a tomografia computadorizada. O tratamento é sempre cirúrgico. **OBJETIVOS** Mostrar as características clínicas, radiológicas, cirúrgicas e anatomopatológicas de um caso de linfangioma cístico de mesentério. **DESCRIÇÃO** GRS, 5 anos, é admitido na emergência por quadro

agudo de dor abdominal. O mesmo já vinha em investigação ambulatorial quanto a episódios recorrentes de dores abdominais. Estes tiveram início no primeiro ano de vida e tinham ocorrência eventual, muitas vezes necessitando de analgesia intravenosa. A ecografia abdominal mostrou imagem sugestiva de cisto de mesentério. O tratamento consistiu em cirurgia por videolaparoscopia. Neste procedimento, a lesão foi tracionada por incisão em fossa ilíaca direita seguida de enterectomia de segmento intestinal (já que o mesmo envolvia lesão) e posterior êntero-êntero anastomose término-terminal. O estudo anatomopatológico confirmou o diagnóstico. O pós-operatório ocorreu sem complicações e o paciente está assintomático atualmente.

RESULTADOS E CONCLUSÕES Os linfangiomas abdominais podem causar oclusões intestinais e distensão abdominal. A principal apresentação clínica é a dor abdominal, mas também há casos assintomáticos e de abdome agudo. Sua localização mais comum é o mesentério do intestino delgado. Já houve casos de transformação maligna em adenocarcinoma e de recorrência (porém sem necessidade de nova exploração cirúrgica). O cirurgião deve planejar apropriadamente a cirurgia para evitar morbidades, uma vez que o objetivo do tratamento é a cura.