

**LOCALIZAÇÃO E COMPLICAÇÕES PRÉ-OPERATÓRIAS DAS ESTENOSES URETRAIS NO HCPA**

Vinicius Rubin, Eduardo Terra Lucas, Tiago Bortolini, Brasil Silva Neto, Milton Berger, Tiago Elias Rosito

Introdução: Os estreitamentos uretrais podem ser classificados de acordo com sua localização, divididos basicamente entre uretra anterior e posterior e possuem diferentes origens etiológicas, como as iatrogênicas, traumáticas, congênicas e infecciosas. As complicações causadas pela estase urinária incluem desde episódios únicos de retenção urinária aguda até recorrentes com necessidade de cistostomia ou ainda infecções do trato urinário de repetição. O diagnóstico definitivo é feito através da uretrocistografia retrógrada miccional, exame que localiza a porção da estenose, bem como sua extensão. Objetivos: Analisar índice de complicações pré-operatórias decorrentes da estenose e a localização da mesma na uretra. Material e métodos: 20 pacientes de 18 a 75 anos que concordaram em participar do estudo e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, através da realização de uretrocistografia retrógrada miccional e história médica pregressa. Resultados e conclusões: Dos 20 pacientes analisados, 15 (75%) apresentavam episódio de retenção urinária prévia, 10 (50%) com necessidade de cistostomia e 6 (30%) com história de infecções urinárias de repetição. Além disso, 6 (30%) apresentavam estenose na uretra bulbar, 4 (20%) na membranosa, 3 (15%) na peniana e 7 (45%) mista. A localização, o número e o tamanho das estenoses, assim como a determinação da presença de fístulas, são de fundamental importância na determinação do plano cirúrgico buscando oferecer o melhor tratamento ao paciente e obter uma taxa de sucesso elevada.