

199

NOVAS CONTRIBUIÇÕES AO CONHECIMENTO DE GÊNERO *PSEUDEVOPLITUS* RUCKES, 1958 (HETEROPTERA, PENTATOMIDAE, PENTATOMINI). *Caroline Greve e Jocélia Grazia.* Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CNPq).

O gênero *Pseudevoplitus* foi descrito por Ruckes, 1958 para a espécie *Pseudevoplitus paradoxus*. Esta espécie tem hoje distribuição conhecida no Peru, Brasil, Bolívia e Argentina. Mais três espécies foram adicionadas a este gênero: *P. longicornis* Ruckes, 1959, *P. casei* Thomas, 1980 e *P. mexicanus* Brailovsky & Barrera, 1982. Grazia et al. (1994) ao revisarem este gênero transferiram as três últimas espécies para o gênero *Adevoplitus* Grazia & Becker. Em *Pseudevoplitus* incluíram três novas espécies: *P. costalimai* de Minas Gerais, Brasil, *P. peruvianus* do Peru e *P. vittatus* de Rondônia, Brasil. Em *Adevoplitus* descreveram duas novas espécies: *A. costaricensis* da Costa Rica e *A. venezuelanus* da Venezuela. Em recente visita à coleção do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus, foram localizados quatro exemplares machos, coletados em Roraima, que apresentavam características gerais, além da morfologia da genitália, conspicuamente distintas das demais espécies conhecidas para o gênero *Pseudevoplitus*. Desta forma, neste trabalho foi descrita mais uma nova espécie, *P. roraimensis*, ampliando a distribuição do gênero para o Brasil. Além da morfologia geral, foi descrita a morfologia da genitália, após dissecação e diafanização. Foram feitas dezoito medidas, obtidas com auxílio de ocular micrométrica; as ilustrações da morfologia externa e de genitália foram feitas com o uso de câmara clara acoplada ao microscópio estereoscópico.