

**ESTUDO DE UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO TERLIPRESSINA.** Martinbiancho J , Jacoby T , Silva D , Santos L , Zuckermann J , Ferreira MA , Moreira LB , Muller MJ . Unidade de Assistência Farmacêutica . HCPA.

Fundamentação:Visando promover o uso seguro e racional dos medicamentos, a Unidade de Assistência Farmacêutica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre realizou um estudo de utilização do medicamento Terlipressina. A Terlipressina é um hormônio antidiurético (análogo da vasopressina) utilizado clinicamente com a finalidade de aumentar as concentrações do fator VIII no sangue.Objetivos:Acompanhar o uso de Terlipressina através da justificativa de uso, duração do tratamento e adesão ao protocolo de hemorragia digestiva elaborado pelos Serviços de Gastroenterologia, Terapia Intensiva, Emergência e Medicina Interna do HCPA.Causística:Durante o período de março a maio de 2004 foram acompanhados 32 pacientes, totalizando 100% dos pacientes com prescrição no período. O acompanhamento foi realizado mediante análise do prontuário e preenchimento do instrumento de coleta, elaborado juntamente a COMEDI, onde constam informações referentes ao motivo da internação (clínica ou emergencial), diagnóstico principal, ocorrência de sangramento ativo, realização de escleroterapia, utilização de dose de ataque (2mg, endovenosa (EV) em bolus) dose e duração do tratamento (1mg, EV – de 4 em 4 horas – durante 48 horas), interrupção do sangramento, transfusões (CHAD) e ressangramento. Resultados:Analisando os dados do acompanhamento, foi possível identificar que os principais motivos para uso do medicamento estão associados a casos de cirrose alcoólica, hepatite crônica viral C e hemorragia digestiva alta por varizes esofágicas. Foi verificado aumento na adesão ao protocolo de hemorragia digestiva 21%(março), 50%(abril) e 100%(maio) (fig. 1) associado à redução do número de pacientes em uso de terlipressina de 14 pacientes em março para 13 e 05 pacientes em abril e maio, respectivamente (fig.2).Conclusões:Através deste estudo, foi possível identificar que em algumas situações a terlipressina não estava sendo utilizada como preconiza o protocolo. Com isso foram realizadas intervenções e verificou-se maior adesão ao protocolo assistencial de hemorragia digestiva proposto pelo HCPA, associado à redução considerável no número de pacientes em uso do medicamento.