

044

INCIDÊNCIA DA HEPATITE C EM PACIENTES PORTADORES DE LIQUEN PLANO ORAL DO SERVIÇO DE ESTOMATOLOGIA DO HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS. *Roberto de Carvalho e Silva Massulo; Liliane Soares Yurgel (PUCRS)*

O líquen plano é uma patologia inflamatória crônica de etiologia ainda desconhecida que pode afetar a pele, as membranas mucosas ou ambas. Foi descrita pela primeira vez em 1869 por Erasmus Wilson e até o momento, sua patogênese permanece não esclarecida. Diversas patologias já foram associadas ao Líquen plano e, em especial, à forma oral desta entidade. Recentemente uma associação entre o Líquen plano bucal e a hepatite pelo vírus C foi proposta (MONKI et al. 1991). A hepatite C constitui um dos mais importantes problemas de saúde pública da atualidade. A infecção, na grande maioria dos casos, é assintomática e lentamente progressiva, produzindo cirrose em 20% dos pacientes (FOCACCIA, SOUZA, 1996). Este estudo tem como objetivo pesquisar a frequência da associação entre o líquen plano bucal e a hepatite C. Foram analisadas 310 fichas clínicas dos pacientes com Líquen plano oral, nas quais continham 79 exames complementares anti-HCV, sendo 04 reagentes. Pesquisa em andamento.