



<b>Evento</b>	Salão UFRGS 2013: SIC - XXV SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
<b>Ano</b>	2013
<b>Local</b>	Porto Alegre - RS
<b>Título</b>	Consumo lácteo de pré-termos de muito baixo peso em seguimento ambulatorial em um hospital geral universitário
<b>Autor</b>	BIANCA CHASSOT BENINCASA
<b>Orientador</b>	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS SILVEIRA

**Introdução:** A prevalência de aleitamento materno para recém-nascidos prematuros ainda é reduzida, apesar das evidências acerca de seus benefícios. Segundo as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde do Brasil, o aleitamento materno deve ser exclusivo até o 6º mês de vida para todas as crianças.

**Objetivo:** Descrever o tipo de leite consumido por crianças pré-termo de muito baixo peso em seguimento ambulatorial aos 6 e aos 12 meses de idade corrigida (IC).

**Metodologia:** Estudo de coorte, prospectivo e observacional realizado em ambulatório de seguimento de prematuros de muito baixo peso em um hospital terciário de Porto Alegre no período de 2004 à 2010. Coletados dados antropométricos do nascimento e dados acerca do tipo de leite (leite materno, leite de vaca e fórmula láctea) recebido pelos pacientes aos 6 e 12m IC. Estudo aprovado pelo CEP da instituição. Análise estatística realizada com SPSS versão 18.0.

**Resultados:** Avaliadas 332 crianças. Idade gestacional final média  $30\pm 2$  semanas, peso ao nascer médio de  $1194,2\pm 223,8$ g, média do comprimento ao nascer de  $37\pm 2,8$  cm e média de perímetro cefálico ao nascimento de  $26,8 \pm 2$  cm. Aos 6m IC 8,1% (n=27) recebiam aleitamento materno exclusivo (AME), 31,6% (n=105) tomavam leite de vaca exclusivamente (LVE), 48,5% (n=161) dos pacientes estavam em uso de fórmula láctea exclusiva (FE) e 9,6% (n=32) recebiam aleitamento materno misto (leite materno associado fórmula e/ou leite de vaca). Aos 12m IC 1,2% (n=4) estavam em AME, 70,5% (n=234) tomavam LVE, 16,9% (n=56) das crianças usavam FE e 12,3% (n=23) recebiam aleitamento materno misto. Houve 2 casos de crianças consumindo extrato de soja aos 6m IC e 1 caso aos 12m IC. O tipo de leite consumido com 6m IC teve relação inversa com IG final e com a classificação de peso para IG, e relação direta com idade da mãe. Tipo de leite consumido aos 12m IC teve relação inversa com IG final e relação direta com tipo de leite consumido aos 6mIC.

**Conclusão:** Os índices de aleitamento materno encontrados estão abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Ressaltamos porém, que prematuros de muito baixo peso são uma população de alto risco para desmame precoce, tendo em vista as comorbidades e diversos fatores que podem influenciar no tempo de aleitamento materno. Uma vez conhecida a dimensão do desmame precoce nessa coorte, novas estratégias específicas para o aleitamento materno em população de alto risco, deverao ser implementadas .