

036

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO USO DE SILDENAFIL (VIAGRA) NO TRATAMENTO DE DISFUNÇÃO ERÉTIL. *Rossol A, Moura L, Ferreira M, Scheibe AB, Mallmann F, Koff W.* Serviço de Urologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Fundamentação: A disfunção erétil (DE) acomete um grande número de homens, sendo que Feldman e cols. encontrou 52% de prevalência na faixa etária entre 40 e 70 anos. As conseqüências à saúde desta condição podem apresentar efeitos dramaticamente negativos sobre as vidas destes pacientes e de suas parceiras. O citrato de sildenafil - VIAGRA é o primeiro composto de uma nova classe de agentes orais para o tratamento da DE, que restabelece a função erétil comprometida através do aumento do fluxo sanguíneo peniano, permitindo que ocorra uma resposta natural após estímulo sexual. Objetivos: avaliar a eficácia do sildenafil em pacientes com diagnóstico de DE há, pelo menos, 6 meses, além de verificar o nível de satisfação dos pacientes ao final do tratamento. Casuística e Métodos: Delineamento – estudo clínico aberto com doses escalonadas flexíveis; Material – foram analisados 15 pacientes masculinos no período de dezembro de 1998 a abril de 1999; Métodos – foram colhidos dados demográficos e história clínica, aplicados Índice Internacional de Disfunção Erétil (IIFE) e Questionário de Qualidade de Vida QQV antes e depois do uso de sildenafil nas doses de 50 a 100mg via oral uma vez ao dia num período de seis semanas. Resultados: Foram avaliados 15 homens no período de dezembro de 1998 a abril de 1999 com média de idade de 55 ± 8,04 anos. Onze pacientes eram tabagistas e onze faziam uso de álcool, com uma média de 2,3 ± 2,09 doses semanais. O tempo médio duração da DE antes do tratamento foi de 56,57 ± 48,76 meses, com 60% dos pacientes apresentando DE do tipo orgânica. O IIFE inicial e final tiveram uma média de 38,4 ± 12,66 e 58,8 ± 10,03 respectivamente; e as médias dos QQV inicial e final foram de 25,86 ± 6,82 e 31,6 ± 3,99 respectivamente. Conclusões: O IIFE e o QQS demonstraram que a maioria dos pacientes obteve melhora importante da DE o período de tratamento com sildenafil, demonstrando a eficácia deste fármaco em pacientes com disfunção erétil.