

124

AVALIAÇÃO DO RISCO TERATOGÊNICO DO USO DE FENPROPorex DURANTE A GESTAÇÃO*Fernando Procianoy, Carolina M. Moser, Carlos G. V. Berwanger, Roger K. Moreira, Maria Teresa V. Sanseverino, Lavínia Schüler-Faccini (SIAT/HCPA, UFRGS)*

O Fenproporex é um anorexígeno pertencente ao grupo das anfetaminas, estimulantes de ação central amplamente utilizados no tratamento da obesidade. No feto, a meia-vida da droga é maior que na gestante, e o uso da droga está associado a elevação da pressão arterial materna e fetal e à diminuição da saturação de oxi-hemoglobina fetal e do pH. O aumento transitório da resistência vascular no cordão umbilical e a diminuição do fluxo sanguíneo para o útero acompanham estas alterações. Devido à pouca informação disponível sobre os riscos teratogênicos em humanos, estamos realizando uma avaliação de recém-nascidos cujas mães usaram a medicação durante a gravidez. Foram incluídas todas as consultas feitas ao Sistema Nacional de Informações sobre Agentes Teratogênicos (SIAT) referentes a gestações com uso de Fenproporex. Para estas mulheres, no momento da consulta, foi aplicado um questionário padronizado. Após o nascimento do bebê, realiza-se um novo questionário averiguando a evolução da gestação, as condições de saúde do bebê e a presença de malformações. De um total de 2684 consultas ao SIAT entre 1990 e 1999, 22 (0,81%) tiveram como motivo o uso de Fenproporex. Destas, 18 (81%) eram gestantes, e 4 casos tratavam-se de crianças já nascidas com alguma malformação (consultas retrospectivas). No presente momento, estamos realizando os seguimentos das consultas prospectivas. Até agora nenhum padrão malformativo específico foi relacionado à exposição gestacional ao Fenproporex.